

2012-03-15 18:52:16 - Garcia,juan

Tratamientos: El consomé de pollo se ha utilizado para tratar los resfriados frecuentes al menos desde el siglo XII y realmente puede socorrer. La sal, el calor y el líquido le pueden socorrer a el individuo a combatir la infección.

2012-03-15 18:51:23 - Garcia,juan

Recomendaciones: **Lavarse las manos:** los niños y adultos deben lavarse las manos en momentos claves, como después de sonarse la nariz, después de cambiar pañales o ir al baño, antes de consumir y antes de preparar alimentos.

Usar desinfectantes manuales instantáneos: un pequeño toque acabará con el 99,99% de los gérmenes sin necesidad de agua ni toallas. Estos productos contienen alcohol para destruir los gérmenes. Son un antiséptico, no un antibiótico, así que no se puede desplegar resistencia.

Utilizar toallas de papel en lugar de las toallas de tela que se comparten.

A continuación se presentan siete formas de apoyar al sistema inmunitario:

Evitar antibióticos innecesarios: cuanto más se utilicen los antibióticos, mayor será la probabilidad de resultar enfermo en el futuro con infecciones más prolongadas y pertinaces causadas por organismos más resistentes.

Evitar el humo de cigarrillos: se recomienda mantenerse lo más alejado probable del humo del cigarrillo, ya que es el responsable de muchos problemas de salud, incluyendo millones de resfriados.

Dormir bien: ir a la cama tarde y no dormir bien deja a los individuos en un estado de vulnerabilidad.

Tomar agua: el organismo necesita líquidos para que el sistema inmunitario funcione apropiadamente.

2012-03-15 18:50:40 - Garcia,juan

Recomendaciones: Se aconseja descansar y tomar líquidos en abundancia. Los remedios de venta libre para el resfriado pueden socorrer a aliviar los síntomas. Estos realmente no acortan la duración del resfriado, pero pueden socorrer a que el individuo se sienta mejor.

2012-03-15 18:50:00 - Garcia,juan

Diagnósticos: Infección viral de las vías respiratorias altas; Resfriado

2012-03-15 18:42:13 - Garcia,juan

Notas:

Windows Internet Explorer 8. New windows and pop-ups always inherit the zoom level of the parent window.

Internet Explorer 7. The **Back**, **Forward**, and **Stop** commands are now located in the Navigation bar of the user interface. Prior to Internet Explorer 7 navigation commands were located in the toolbar.

Internet Explorer 7 on Windows Vista. Opening a new window from an application other than the Internet Explorer process may result in a NULL return value. This occurs because Internet Explorer runs in protected mode by default. Protected mode prevents applications from privileged access to Internet Explorer when that access spans process boundaries. Because this method opens windows in a new process, protected mode restricts access to the new window. For more information, please see [Understanding and Working in Protected Mode Internet Explorer](#).

Internet Explorer 6 for Windows XP SP2 places several restrictions on windows created with this method. For several of the parameter values listed in the Parameters table, these restrictions are indicated by the minimum value. For more information, see [About Window Restrictions](#).

This method must use a user-initiated action, such as clicking on a link or tabbing to a link and pressing enter, to open a pop-up window. The Pop-up Blocker feature in Internet Explorer 6 blocks windows that are opened without being initiated by the user. The Pop-up Blocker also prevents windows from appearing if you call this method from an [onunload](#) event.

2012-03-13 16:32:10 - Garcia,juan

Evolutivos: Evoluciona según lo previsto.

2012-03-13 13:12:10 - Garcia,juan

Antecedentes: **Alergias:** Polen

2012-03-12 17:11:38 - Garcia,juan

Notas: Nota simple con un adjunto

2012-03-02 17:57:36 - Garcia,juan
Antecedentes: **Alergias:** Velocidad
Hábitos: Deportista

2011-12-18 11:11:22 - Garcia,juan
Anamnesis: nueva anamnesis

2011-12-18 11:08:49 - Garcia,juan
Antecedentes: **Enfermedades:** eeeee